ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата
«Триолакт»

1. Торговое наименование: Триолакт (Triolactum).

2. Международное непатентованное наименование: амоксициллин, клоксациллин, преднизолон.

3. Регистрационный номер: 6876-10-19 ЗА.

4. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

Описание: маслянистая суспензия от белого до желтого цвета.

5. Состав: в 1,0 мл препарата в качестве действующих веществ содержится: 26,9 мг амоксициллина (в форме амоксициллина тригидрата), 44,8 мг клоксациллина (в форме клоксациллина натриевой соли), 2,7 мг преднизолона и вспомогательные вещества: моноглицериды дистиллированные, эмульгатор и масло вазелиновое.

6. Фармакотерапевтическая группа: пенициллины в комбинациях.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика: комбинация полусинтетических антибиотиков группы пенициллинов – амоксициллина и клоксациллина, входящая в состав препарата, обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных - *Staphylococcus spp. (*в т.ч. резистентных к действию бензилпенициллина*), Streptococcus spp.(*в т.ч. *Str. agalactiae, Str. dysagalactiae, Str. uberis), Clostridium spp., Corynebacterium spp.* и грамотрицательных бактерий - *Haemophilus spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus spp.*

Преднизолон, обладая противовоспалительным действием, уменьшает воспаление и отек тканей вымени.

Механизм антибактериального действия амоксициллина и клоксациллина заключается в подавлении функциональной активности бактериальных ферментов транспептидаз, участвующих в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов - пептидогликана, что препятствует синтезу клеточной стенки бактерий и приводит к нарушению осмотического баланса и гибели бактерий.

Интрацистернальное введение препарата позволяет обеспечить бактерицидные концентрации действующих веществ в пораженной четверти вымени на протяжении 12 часов.

Триолакт по классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего действия на ткани молочной железы.

8. Показания для применения: Триолакт применяют коровам в период лактации для лечения мастита бактериальной этиологии.

9. Противопоказания: индивидуальная повышенная чувствительность животного к антибиотикам группы пенициллинов и/или к одному из компонентов лекарственного препарата (в том числе в анамнезе).

10. Способ применения: Триолакт вводят интрацистернально по 5 мл (1 шприц-дозатор) в пораженную четверть вымени 3-6 раз (в зависимости от тяжести заболевания) с интервалом 12 часов.

Перед введением препарата из больной четверти вымени секрет выдаивают, а сосок дезинфицируют 70% этиловым спиртом или специальной антисептической салфеткой.

Перед применением шприц-дозатор с Триолактом рекомендуется тщательно взболтать, а при необходимости подогреть до температуры тела животного.

Канюлю шприц-дозатора вводят в канал соска и осторожно выдавливают препарат в пораженную долю вымени. После введения вынимают шприц-дозатор и пальцами пережимают сосок на 1-2 минуты. Затем проводят легкий массаж вымени снизу-вверх для лучшего распределения препарата.

11. Меры предосторожности при применении: при работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

12. Передозировка: симптомы передозировки не установлены.

13. Беременность и период лактации: противопоказаний и особенностей применения препарата коровам в период беременности и лактации отсутствуют. Препарат не предназначен для применения молодняку.

14. Особые указания: следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме. Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость: при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у коров, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают десенсибилизирующую терапию.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами: применение препарата не исключает использование других лекарственных средств, за исключением антибактериальных препаратов для интрацистернального введения.

17. Форма выпуска: шприц-дозаторы по 5 мл, снабженные канюлей для интрацистернального введения, укупоренные защитными колпачками.

18. Срок годности: в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения и транспортирования - 2 (два) года со дня производства. Запрещается использовать препарат по истечении срока годности.

19. Условия хранения: хранят в закрытой упаковке производителя в защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25°С. Препарат хранят отдельно от продуктов питания и кормов, в недоступном для детей месте.

20. Условия отпуска: отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения: препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения после применения Триолакта продуктивным животным: молоко в пищевых целях можно использовать не ранее, чем через 60 часов после последнего введения препарата. Молоко, полученное во время лечения или ранее установленного срока из здоровых четвертей вымени, может быть использовано после кипячения в корм животным; молоко из больных четвертей вымени после обеззараживания утилизируют.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

23. Правообладатель лекарственного препарата: общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «АГРОФАРМ»: ООО НПП «АГРОФАРМ»; Россия, 394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к. 18, адрес осуществления деятельности: 394033, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Витрука, д.1 А., тел: (473) 253- 93- 99, адрес электронной почты: e-mail: info@agrofarmvrn.ru.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата: общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «АГРОФАРМ»: ООО НПП «АГРОФАРМ», Россия, 394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к. 18; адрес производственной площадки: 394033, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Витрука, д.1 А., тел: (473) 253- 93- 99, адрес электронной почты: e-mail: info@agrofarmvrn.ru.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий: общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «АГРОФАРМ»: ООО НПП «АГРОФАРМ»; Россия, 394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к. 18, адрес места осуществления деятельности: 394033, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Витрука, д.1 А., тел: (473) 253- 93- 99, адрес электронной почты: e-mail: info@agrofarmvrn.ru.