

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Элтимаст

(Организация-разработчик: ООО НПП «АГРОФАРМ», Россия,
394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, кв. 18)

Номер регистрационного удостоверения:

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

- торговое наименование: Элтимаст (Eltimastum);
- международные непатентованные наименования действующих веществ: левофлоксацин, тилмикозин.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

Элтимаст в качестве действующих веществ содержит: левофлоксацин (в виде гемигидрата) – 53,2 мг/мл, тилмикозин (в виде фосфата) – 26,6 мг/мл, а также вспомогательные вещества: парафин твёрдый, магния стеарат и масло вазелиновое – до 1 мл.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой маслянистую суспензию светло-жёлтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года с даты производства. Запрещается применение Элтимаста по истечении срока годности.

4. Элтимаст выпускают расфасованным по 5 мл в шприц-дозаторы, укупоренные защитными колпачками. Шприц-дозаторы помещают в картонные коробки или пачки по 20 штук. Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению препарата.

5. Элтимаст хранят в закрытой упаковке производителя, в защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Элтимаст следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается Элтимаст по рецепту (требованию) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. Элтимаст относится к лекарственным средствам фармакотерапевтической группы: фторхинолоны в комбинациях.

10. Входящий в состав препарата левофлоксацин относится к группе фторхинолонов, оказывает бактерицидное действие на аэробные грамположительные микроорганизмы: *Arcanobacterium* spp., *Corynebacterium* spp., *Enterococcus* spp., *Listeria* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bacillus* spp.; аэробные грамотрицательные микроорганизмы: *Acinetobacter* spp., *Actinobacillus* spp., *Aeromonas* spp., *Campylobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Escherichia coli*, *Haemophilus* spp., *Klebsiella* spp., *Leptospira* spp., *Moraxella* spp., *Morganella morganii*, *Pasteurella* spp., *Proteus* spp., *Pseudomonas* spp., *Salmonella* spp., *Serratia* spp.; анаэробные микроорганизмы: *Bacteroides* spp., *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp.; а также *Chlamydia* spp., *Mycobacterium* spp., *Mycoplasma* spp., *Rickettsia* spp. Механизм действия левофлоксацина заключается в блокаде ДНК-гиразы (топоизомеразы II) и топоизомеразы IV, нарушении суперспирализации и сшивки разрывов ДНК, ингибировании синтеза ДНК, глубоких метаболических изменениях в цитоплазме, клеточной стенке и мембранах.

Тилмикозин, входящий в состав препарата Элтимаст, активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Arcanobacterium* spp., *Chlamydia* spp., *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Mycoplasma* spp., *Pasteurella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. и других. В основе его бактериостатического действия лежит блокирование белкового синтеза в микробной клетке в результате образования комплекса с 50S-субъединицей рибосом.

При интрацестернальном введении действующие вещества препарата слабо всасываются в кровь и локализуются в тканях молочной железы. Комбинация левофлоксацина и тилмикозина обеспечивает широкий спектр антимикробной активности, а благодаря специальной основе наблюдается пролонгированное антибактериальное действие препарата до 4 недель.

Элтимаст по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Элтимаст применяют для профилактики и лечения мастита бактериальной этиологии у коров в сухостойный период.

12. Противопоказанием к применению Элтимаста является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе.

13. При работе с препаратом Элтимаст следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть тёплой водой с мылом.

Пустую тару после применения лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Элтимастом. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо немедленно смыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Разрешается применение препарата в период стельности, но не позднее, чем за 40 суток до предполагаемого отёла. Элтимаст запрещается применять коровам в период лактации.

15. Перед применением шприц-дозатор с Элтимастом рекомендуется подогреть до температуры тела животного и тщательно встряхнуть.

Элтимаст вводят клинически здоровым или больным субклиническим маститом коровам после последней дойки при переводе в сухостойный период, но не позднее, чем за 40 дней до предполагаемого отёла, однократно, интрацистернально по 5 мл (содержимое 1 шприца-дозатора) в каждую четверть вымени.

Перед введением препарата содержимое из всех четвертей выдаивают, а сосок дезинфицируют 70% этиловым спиртом или специальной антисептической салфеткой. Затем канюлю шприца-дозатора вводят в сосковый канал и осторожным нажатием на поршень вводят препарат. Далее проводят лёгкий массаж вымени в направлении снизу-вверх для лучшего распределения лекарственного препарата в цистерне вымени.

16. При применении Элтимаста в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у коров, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

18. Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств, за исключением препаратов для интрацистернального введения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Препарат предназначен для однократного применения.

21. Молоко можно использовать для пищевых целей не ранее, чем через 72 часа после отёла коров. Молоко, полученное ранее установленного срока, можно использовать в корм животным после кипячения.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 35 суток после введения Элтимаста. Мясо животных вынужденно убитых до

истечения указанного срока может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

ООО НПП «АГРОФАРМ», Россия,
394033, Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Витрука, д.1А

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

ООО НПП «АГРОФАРМ», Россия,
394061, Воронежская обл., г. Воронеж,
проспект Труда, д. 10, кв. 18