СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

_____
_____

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Энроцид

(Организация-разработчик: ООО НПП «АГРОФАРМ», Россия,
394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, кв. 18)

Номер регистрационного удостоверения 15-3-25.13-3291№ПВР-3-0.3/01215

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

- торговое наименование: Энроцид (Enrocidum);
- международное непатентованное наименование действующего вещества: энрофлоксацин.

2. Лекарственная форма: раствор для внутриматочного введения.

Лекарственный препарат в качестве действующего вещества содержит энрофлоксацин - 0,4 г и вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, натрия гидроокись - до pH 10,5 - 12,5, воду очищенную - до 100 мл.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, допускается желтовато-зеленоватый оттенок.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год с даты производства.

Запрещается применение Энроцида по истечении срока годности.

4. Энроцид выпускают расфасованным по 1000 мл в бутылки полимерные, закрытые навинчиваемыми полиэтиленовыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Энроцид хранят в закрытой упаковке производителя в защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°С до 25°С.

6. Энроцид следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Энроцид отпускается по рецепту (требованию) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. Энроцид относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы фторхинолонов.

10. Энрофлоксацин обладает широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действия, подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая Escherichia coli, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Bordetella, Compylobacter, Corinebacterium, Pseudomonas, Proteus, а также Mycoplasma spp., в том числе резистентных к антибиотикам, сульфаниламидам и производным нитрофурана.

Механизм действия энрофлоксацина заключается в ингибировании активности фермента гидразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки.

Выводится энрофлоксацин из организма животного главным образом в неизмененной форме и в виде метаболитов, в основном с мочой, у лактирующих животных - частично с молоком.

Энроцид по степени воздействия на организм относится к веществам «малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

11. Энроцид применяют коровам и свиноматкам для профилактики и лечения послеродового эндометрита и других воспалительных заболеваний бактериальной этиологии матки, после родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа и при синдроме метрит-мастит-агалактии у свиноматок.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе.

13. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Энроцида следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Энроцидом. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки, их необходимо промыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14.Энроцид не применяется беременным животным. Ограничения к использованию препарата в период лактации отсутствуют.

15. Препарат вводят внутриматочно: коровам в дозе 100 мл на животное, свиноматкам в дозе 50-75 мл на 100 кг массы животного:

- с лечебной целью каждые 48 часов до клинического выздоровления, но не более 5 раз;
- с профилактической целью после родовспоможения или оперативного отделения последа однократно.

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата и после этого вводят Энроцид с помощью шприца Жане или прибора для искусственного осеменения свиней ПОС-5 и катетера.

16. При применении Энроцида в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у коров и свиноматок, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

17. Симптомов передозировки у животных не выявлено.

18. Не следует применять Энроцид одновременно с бактериостатическими антибиотиками (хлорамфениколом, тетрациклинами) и нитрофуранами, в связи с возможным снижением антибактериальной активности, а также с теофилином и нестероидными противовоспалительными средствами.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют как можно скорее в той же дозировке и по той же схеме.

21. Убой коров и свиноматок на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после последнего применения Энроцида. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

Молоко, полученное от коров в период лечения и в течение 6 суток после последнего введения препарата, запрещается использовать для пищевых целей. Такое молоко после кипячения может быть использовано в корм животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	ООО НПП «АГРОФАРМ», Россия, 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Витрука, д.1 А

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ООО НПП «АГРОФАРМ», Россия, 394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, кв. 18